

Lo svernamento
degli uccelli acquatici
in Emilia-Romagna
1994-2009




ZAFFERANO

Larus fuscus Linnaeus, 1758



Foto Marco Basso

Specie politipica a distribuzione eurasiatica, presente in Europa con quattro sottospecie (*fuscus*, *graellsii*, *intermedius*, *heuglini*) ed areale di nidificazione attualmente in espansione con insediamenti sulla costa del Baltico meridionale, dell'Atlantico e nell'area mediterranea della Spagna.



Totali regionali					
periodo	media	min	max	n. siti occupati	% siti occupati
1994-2000	6	0	16	10	5
2001-2005	10	4	13	15	6
2006-2009	1	0	2	5	2

GABBIANO REALE PONTICO

Larus cachinnans Pallas, 1811



Foto Marco Basso

Specie politipica distribuita fra l'Europa orientale e l'Asia centrale, comprese alcune forme di incerta posizione sistematica. E' presente in Italia con individui appartenenti alla sottospecie nominale. Nel nostro Paese la specie è migratrice e svernante regolare. Movimenti tra agosto-dicembre e febbraio-aprile, con sporadiche presenze precoci da fine luglio e tardive in maggio. Nelle regioni nord-orientali primi arrivi in agosto e incremento delle presenze nei mesi successivi, con picco nella seconda metà di gennaio e successivo decremento fino alla seconda decade di aprile (Passarella 2005).

I dati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti coordinati dall'ISPRA non permettono di apprezzare la reale consistenza della popolazione svernante in Italia, in quanto i dati sono stati raccolti a livello cumulativo stante la scarsa conoscenza che si aveva della specie fino a tempi recenti. Per le due specie *Larus michahellis* e *Larus cachinnans* nel periodo 1991-2000 è stata stimata una popolazione di 47.000-93.000 individui, di cui probabilmente almeno 2.000-3.000 attribuibili a *Larus cachinnans*.

periodo	Totali regionali				
	media	min	max	n. siti occupati	% siti occupati
1994-2000	0	0	0	0	0
2001-2005	17	1	25	6	2
2006-2009	5	0	7	5	2

VOLTOLINO

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)



Foto Marco Basso

Specie monotypica a distribuzione euroasiatica; in Italia è considerata specie migratrice regolare, nidificante e svernante irregolare, lo stesso quadro fenologico è applicabile all'Emilia-Romagna. Nel periodo dell'indagine il Voltolino è stato segnalato solamente in 2 anni e sempre in località interne. La prima segnalazione si riferisce all'AFV Fienile Vecchio (PR) nel 2001; la seconda è riferita sempre ad 1 esemplare osservato nelle Valli di Mortizzuolo e San Martino Spino (MO) nel gennaio 2009. È probabile che la presenza del Voltolino sia più numerosa di quanto emerge dai nostri dati, stante le sue abitudini criptiche e l'assoluta assenza di vocalizzazioni durante i mesi invernali; questo è forse l'unico metodo valido per contattare una specie elusiva anche durante i periodi di massima frequenza. In Europa il Voltolino ha uno stato di conservazione favorevole (No SPEC).

Carlo Giannella

CORRIERE PICCOLO

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Specie politipica a distribuzione paleartico orientale; in Italia è considerata specie migratrice regolare, nidificante e svernante regolare anche se con numeri molto piccoli (30-80 esemplari). In Emilia-Romagna è considerata specie migratrice regolare nidificante, irregolarmente svernante. Tipico migratore transahariano, il Corriere piccolo nel periodo d'indagine è stato segnalato in due sole località: Val Campotto (FE) e Valli di Mortizzuolo e San Martino Spino (MO); il primo caso nel 2008 ha interessato lo svernamento di 7 individui, mentre il secondo nel 2009 quello